

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

Poznámka:

Připojištění trvalých následků úrazu se sjednává ve variantě od 1 % nebo od 10 %. Je-li sjednána varianta od 10 %, pak vzniká nárok na plnění jen při procentu poškození min. 10 %.

Číslo diagnózy	Trvalý následek	Procento poškození
	Hlava a smyslové orgány	
1	úplná ztráta obou očí	100%
2	úplná ztráta jednoho oka	50%
3	ztráta čočky na jednom oku, která nezpůsobila slepotu	15%
4	ztráta čočky na obou očích, která nezpůsobila slepotu	30%
5	snížení zrakové ostrosti či ztráta zraku jednoho oka – hodnocení dle pomocné tabulky (příloha č. 3)	viz přílohu č. 3
6	snížení zrakové ostrosti či ztráta zraku obou očí – hodnocení dle pomocné tabulky (příloha č. 3)	viz přílohu č. 3
7	úplná ztráta sluchu obou uší	60%
8	úplná ztráta sluchu jednoho ucha	15%
9	traumatické poškození sluchu jednoho ucha (na základě audiometrického vyšetření)	1–10%
10	traumatické poškození sluchu obou uší (na základě audiometrického vyšetření)	11–20%
11	úplná ztráta jednoho celého boltce	10%
12	úplná ztráta obou celých boltců	15%
13	deformace nosní přepážky s funkčně významnou poruchou nosní průchodnosti	2%
14	úplná ztráta celého nosu	20%
15	chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo po popálení	do 10 %
16	částečné odstranění dolní čelisti nebo poloviny čelistní kosti	40%
17	trvalé následky po jednoduché zlomenině spodiny lebeční	1%
18	trvalé následky po komplikované zlomenině spodiny lebeční	10%
19	úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm ²	5%
20	úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm ²	15%
21	úplný defekt v klenbě lební v rozsahu nad 10 cm ²	20%
22	úplná traumatická porucha lícního a trojklaného nervu po ukončení léčby	10%
23	poškození tváře (po ukončení léčby) – podélné keloidní jizvy od 2 cm do 4 cm	1%
24	poškození tváře (po ukončení léčby) – podélné keloidní jizvy nad 4 cm	3%
25	poškození tváře (po ukončení léčby) – podélné jizvy nad 5 cm	2%
26	omezení hybnosti sanice s možností oddálení čelistí do 1 cm	5%
27	úplná nehybnost sanice	25%
28	ztráta více než poloviny jazyka	10%
29	ztráta celého jazyka	40%
30	ztráta jednoho zubu (více než poloviny)	1%
31	ztráta každého dalšího zubu (více než poloviny)	1%
32	ztráta více než 5 zubů (ztráta 6 a každého dalšího zubu)	2%
33	ztráta vitality	neplní se
34	ztráta, nalomení, poškození mléčného zubu a umělého chrupu	neplní se
35	vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy lehkého stupně	20%
36	vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy středního stupně	50%
37	vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy těžkého stupně	100%
	Krk	
38	stav po úrazu průdušnice nebo hrtanu s trvale zavedenou kanylou	50%
39	ztráta hlasu (afonie)	25%
40	ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	30%
	Úrazy hrudníku, plic, srdce nebo jícnu	
41	následky poranění plic a hrudníku podle stupně porušení funkce a rozsahu – jednostranné	20–40%
42	následky poranění plic a hrudníku podle stupně porušení funkce a rozsahu – oboustranné	40–80%
43	poruchy srdeční a cévní, klinicky ověřené, podle stupně porušení funkce	20–80%
44	píštěl jícnu	30%
45	poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně	10%
46	poúrazové zúžení jícnu středního až těžkého stupně	30–60%

	Břicho a trávicí orgány		
47	porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy funkce		20–80%
48	ztráta sleziny		20%
49	sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí		30–60%
50	poúrazové zúžení konečníku podle rozsahu		10–40%
	Močové a pohlavní orgány		
51	ztráta jedné ledviny		25%
52	ztráta obou ledvin		75%
53	píštěl močového měchýře nebo močové trubice		50%
54	ztráta jedné pohlavní žlázy		20%
55	ztráta obou pohlavních žláz		50%
56	ztráta nebo závažné deformity zevních pohlavních orgánů včetně prsů u žen		10–50%
	Páteř a mícha		
57	omezení hybnosti páteře lehkého stupně		5–10%
58	omezení hybnosti páteře středního stupně		11–25%
59	omezení hybnosti páteře těžkého stupně		26–55%
	(nelze současně hodnotit podle položek 60–62)		
60	poúrazové poškození míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce – lehkého stupně		10–25%
61	poúrazové poškození míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce – středního stupně		26–40%
62	poúrazové poškození míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce – těžkého stupně		41–100%
	(nelze současně hodnotit podle položek 57–59)		
	Pánev		
63	porušení souvislosti pánevního prstence pouze s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin		15–65%
	Horní končetiny		
	Hodnota ze sloupce „Domin.“ se použije, pokud dojde k trvalým následkům na dominantní horní končetině, tzn. u praváka na pravé, u leváka na levé. Hodnota ze sloupce „Nedomin.“ se použije v případě trvalých následků na nedominantní horní končetině.	Domin.	Nedomin.
64	ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem	70%	60%
65	úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká)	35%	30%
66	úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50°, předpažení 45°, vnitřní rotace 20°)	30%	25%
67	omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně	1–5%	1–3%
68	omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°)	10%	8%
69	omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°)	18%	15%
70	pakloub kosti pažní	40%	35%
71	chronický zánět kostní dřeni jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	30%	25%
72	endoprotéza ramenního kloubu	30%	35%
73	nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce	5%	3%
74	nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu	6%	5%
75	trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu	3%	2%
76	úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká)	30%	25%
77	úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (ohnutí v úhlu do 90°)	20%	16%
78	omezení pohyblivosti loketního kloubu	1–18%	1–15%
79	úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci – v krajním odvrácení nebo přivracení)	20%	16%
80	úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace)	20%	16%
81	pakloub obou kostí předloktí	40%	30%
82	pakloub kosti vřetenní	30%	25%
83	pakloub kosti loketní	20%	15%
84	chronický zánět kostní dřeni kostí předloktí (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	25%	20%
85	viklavý kloub loketní	20%	15%
86	totální protéza lokte po úrazu	30%	30%
87	ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu	60%	50%
88	ztráta ruky v zápěstí	55%	45%
89	ztráta všech prstů ruky	50%	42%
90	ztráta prstů ruky mimo palec	45%	38%
91	úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo postaveních jemu blízkých (úplné dlaňové nebo hřbetní ohnutí ruky)	30%	25%
92	úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení	20%	15%
93	pakloub člunkové kosti	15%	13%
94	omezení pohyblivosti zápěstí	1–20%	1–15%
95	ztráta koncového článku palce	9%	7%
96	ztráta palce se záprstní kostí	25%	21%
97	ztráta obou článků palce	20%	15%

98	úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí)	8%	7%
99	úplná ztuhlost základního kloubu palce	6%	5%
100	úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce podle stupně	1–9%	1–7%
101	úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení	25%	20%
102	porucha úchopové funkce palce při omezení mezičlankového kloubu	1–6%	1–5%
103	porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu	1–8%	1–7%
104	porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu	1–9%	1–7%
105	ztráta koncového článku ukazováku	5%	4%
106	ztráta obou článků ukazováku	8%	6%
107	ztráta všech tří článků ukazováku	12%	10%
108	úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení	12%	10%
109	úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí	15%	12%
110	porucha úchopové funkce ukazováku – do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm	4%	3%
111	porucha úchopové funkce ukazováku – do úplného sevření do dlaně chybí 2 až 3 cm	6%	4%
112	porucha úchopové funkce ukazováku – do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm	8%	6%
113	porucha úchopové funkce ukazováku – do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm	10%	8%
114	nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce	3%	2%
115	ztráta celého prstu (prostředníku, prsteníku, malíku) s příslušnou kostí záprstní	9%	7%
116	ztráta všech tří článků prstu (prostředníku, prsteníku, malíku) nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu	8%	6%
117	ztráta koncového článku prstu (prostředníku, prsteníku, malíku)	3%	2%
118	úplná ztuhlost všech tří kloubů prstu (prostředníku, prsteníku, malíku) v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů)	9%	7%
119	poruchy úchopové funkce prstu (prostředníku, prsteníku, malíku) – do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm	2%	1%
120	poruchy úchopové funkce prstu (prostředníku, prsteníku, malíku) – do úplného sevření do dlaně chybí 2 až 3 cm	3%	2%
121	poruchy úchopové funkce prstu (prostředníku, prsteníku, malíku) – do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm	5%	4%
122	poruchy úchopové funkce prstu (prostředníku, prsteníku, malíku) – do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm	8%	6%
123	nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlankových kloubů	1%	1%
124	větší ztráta měkkých částí apexu prstu se současnou deformací nehtu palce nebo ukazováku	2%	1%
	Traumatické poruchy nervů horní končetiny (potvrzené EMG vyšetřením)		
	(v hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické)		
125	traumatická porucha nervu axilárního	1–30%	1–25%
126	traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů	1–45%	1–37%
127	traumatická porucha kmene nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu	1–35%	1–27%
128	obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů	1–15%	1–12%
129	traumatická porucha nervu muskulokutanního	1–30%	1–20%
130	traumatická porucha distálního kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů	1–40%	1–33%
131	traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohýbače karpu a části hlubokého ohýbače prstů	1–30%	1–25%
132	traumatická porucha středního nervu s postižením všech inervovaných svalů	1–30%	1–25%
133	traumatická porucha všech tří nervů (popřípadě celé pleteně pažní)	1–60%	1–50%
	Dolní končetiny		
134	ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu	60%	
135	ztráta jedné dolní končetiny v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	60%	
136	pakloub stehenní kosti nebo nektróza hlavice	40%	
137	endoprotéza kyčelního kloubu bez hodnocení omezení hybnosti kloubu	30%	
138	chronický zánět kostní dřené kosti stehenní (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	1–25%	
139	zkrácení jedné dolní končetiny – o 2 až 4 cm	5%	
140	zkrácení jedné dolní končetiny – o 4 až 6 cm	15%	
141	zkrácení jedné dolní končetiny – o více než 6 cm	25%	
142	pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační) – za každých celých 5° úchytky	5%	
	(úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny; při hodnocení osových úchytky nelze současně hodnotit zkrácení končetiny; úchytky se hodnotí teprve tehdy, když přesahují 5°)		
143	úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)	40%	
144	úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30%	
145	omezení pohyblivosti kyčelního kloubu – lehkého stupně	1–10%	
146	omezení pohyblivosti kyčelního kloubu – středního stupně	11–20%	
147	omezení pohyblivosti kyčelního kloubu – těžkého stupně	21–30%	
148	úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení – úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°	30%	
149	úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení – úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 30°	45%	
150	úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení	1–25%	
151	endoprotéza v oblasti kolenního kloubu bez hodnocení omezení hybnosti kloubu	15%	
152	omezení hybnosti kolenního kloubu – lehkého stupně	1–8%	
153	omezení hybnosti kolenního kloubu – středního stupně	9–12%	

154	omezení hybnosti kolenního kloubu – těžkého stupně	13–25%
155	viklavost kolenního kloubu – v důsledku nedostatečnosti postranního vazy	1–5%
156	viklavost kolenního kloubu – v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého vazy	6–15%
157	viklavost kolenního kloubu – v důsledku nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazy	16–25%
158	trvalé následky po operativním vynětí nejméně 1/3 menisku s poruchou funkce kolenního kloubu	1–5%
159	trvalé následky po operativním vynětí nejméně 1/3 menisku u obou menisků	1–10%
160	ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenním kloubem	50%
161	ztráta dolní končetiny v bérci se zachováním kolenního kloubu	40%
162	pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	40%
163	chronický zánět kostní dřevě kostí bérce (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	1–22%
164	poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osově nebo rotační úchylce (úchytky musí být prokázány rtg. vyšetřením) – za každých 5° úchytky	5%
	(úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce; při hodnocení osově úchytky nelze současně hodnotit zkrácení končetiny; úchytky se hodnotí teprve tehdy, když přesahují 5°)	
165	ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40%
166	ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodézou hlezna	30%
167	ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pahylem v plantární flexi	40%
168	ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25%
169	úplná ztuhlost hlezenního kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupeň plantární flexe nad 20°)	30%
170	úplná ztuhlost hlezenního kloubu v pravouhlém postavení	20%
171	úplná ztuhlost hlezenního kloubu v příznivém postavení (ohnutí plosky kolem 5°)	1–20%
172	omezení pohyblivosti hlezenního kloubu – lehkého stupně	1–5%
173	omezení pohyblivosti hlezenního kloubu – středního stupně	6–10%
174	omezení pohyblivosti hlezenního kloubu – těžkého stupně	11–20%
175	úplná ztráta pronace a supinace hlezenního kloubu (izolovaná)	15%
176	omezení pronace a supinace hlezenního kloubu (izolované)	1–12%
177	viklavost hlezenního kloubu v důsledku nedostatečnosti předního nebo zadního vazy	1–15%
178	vbočená nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy	1–25%
179	chronický zánět kostní dřevě v oblasti tarzu a metatarzu a kosti patní (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	1–15%
180	stav po operaci Achillovy šlachy pro posttraumatickou rupturu	1–3%
181	ztráta všech prstů nohy	15%
182	ztráta obou článků palce nohy	10%
183	ztráta koncového článku palce nohy	3%
184	ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) – za každý prst	2%
185	úplná ztuhlost mezičláňkového kloubu palce nohy	3%
186	úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy	7%
187	úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy	9%
188	poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině	1–15%
189	poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách	1–30%
190	poúrazové atrofie svalstva končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu na stehně	1–5%
191	poúrazové atrofie svalstva končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu na bérce	1–3%
192	traumatická porucha nervu sedacího	1–50%
193	traumatická porucha nervu stehenního	1–30%
194	traumatická porucha nervu obturatorii	1–20%
195	traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	1–35%
196	traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	1–5%
197	traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	1–30%
198	traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	1–20%
199	traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	1–10%
	V hodnocení poruch nervů jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.	
	Jiné úrazy	
	Jizvy a deformity neuvedené v této tabulce, které nezanechají funkční poškození, nejsou v tomto připojištění trvalým následkem úrazu.	
	Poúrazové pigmentační změny nejsou v tomto připojištění trvalým následkem úrazu.	

Pomocná tabulka (pro č. diag. 5 a 6) stupeň poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí:

Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/36	6/60	3/60
6/6	0 %	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	25 %
6/9	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	28 %
6/12	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	31 %
6/15	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	35 %
6/18	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	39 %
6/24	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	44 %
6/36	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %
6/60	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %	55 %
3/60	25 %	28 %	31 %	35 %	39 %	44 %	49 %	55 %	65 %